



海水温度 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

海水温度 各阶段环境指标分布




原文未注明（仅 ZYW-059 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

海水温度・海表水温SST（附件未标单位）

各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

海水温度・淡水水温 各阶段环境指标分布

○

来源汇总值（已有均值）

▬

主要分布区间（中间50%）

|

中位值

□

来源汇总值（原始样品）


◆

平均值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

海水温度·稳定层水温
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

海水温度·表层水温 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度·海表盐度SSS（附件未标单位）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数 平均值 中位值




原始数据附件未标单位（独立变量）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



原文无单位（仅 WGX-001 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

中位值

可计算来源数

平均值

中位值




原文无单位（仅 WGX-025 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数 平均值 中位值



原文无单位（仅 WGX-029 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



原文未注明（仅 ZYW-058 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。


盐度 各阶段环境指标分布



原文未注明（仅 ZYW-059 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度
各阶段环境指标分布



原文未注明（仅 ZYW-064 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

盐度·盐度（原文未标单位）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



原文未标单位（仅本论文内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度·盐度（原文未标单位）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值

□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值

中位值



原文未标单位（独立变量）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度·盐度（原表‰）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

盐度·盐度（质量浓度）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解无机氮 DIN
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解无机氮 DIN • 溶解无机氮DIN (mg/L原表口径)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N · 河流输入硝酸盐NO3
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N • 淡水硝酸盐氮NO3-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N • 硝酸盐 NO₃ (离子质量)
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N · 硝酸盐NO3
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N · 硝酸盐加亚硝酸盐NO₃+NO₂
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数 平均值 中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐氮 NO₃-N • 硝酸盐氮NO3-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值


□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


硝酸盐氮 NO₃-N · 硝酸盐 (NO₃, mg/L原文)
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

亚硝酸盐氮 NO₂-N • 亚硝酸盐 NO₂ (离子质量)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值) 主要分布区间 (中间50%) | 中位值 可计算来源数 平均值 中位值
□ 来源汇总值 (原始样品) ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

亚硝酸盐氮 NO₂-N · 亚硝酸盐NO2 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

亚硝酸盐氮 NO₂-N 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

亚硝酸盐氮 NO₂-N • 亚硝酸盐氮NO2-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

亚硝酸盐氮 NO₂-N · 亚硝酸盐 (NO₂, mg/L原文)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值) 主要分布区间 (中间50%) | 中位值
□ 来源汇总值 (原始样品) ◆ 平均值

可计算
来源数 平均值 中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

铵盐氮 NH₄-N • 淡水铵态氮NH₄-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

铵盐氮 NH₄-N • 铵 NH₄ (离子质量)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

铵盐氮 NH₄-N • 铵态氮NH₄
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

铵盐氮 NH₄-N • 铵态氮NH₄-N
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



mg N/L

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

铵盐氮 NH₄-N
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 · 正磷酸盐（原文未明元素/离子质量基准）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



mg/L（元素/离子质量基准未报告，独立变量）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

磷酸盐 / 无机磷 · 淡水磷酸盐磷PO4-P
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 · 磷酸盐 PO₄ (离子质量)
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 · 磷酸盐PO4
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 · 磷酸盐磷PO4-P
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



mg P/L

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

磷酸盐 / 无机磷 · 磷酸盐 (PO4, mg/L原文)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解有机氮 DON 各阶段环境指标分布




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解有机氮 DON 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值) 主要分布区间 (中间50%) | 中位值
□ 来源汇总值 (原始样品) ◆ 平均值


可计算
来源数 平均值 中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


溶解有机磷 DOP 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总溶解氮 TDN 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氮磷比 · N/P（标度未报告）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值

□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值

中位值



比值（标度未报告，独立变量）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。


氮磷比·原文N/P（形态及摩尔/质量口径未明）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氮磷比·无机氮磷摩尔比DIN:DIP
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值

□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氮磷比·无机氮磷摩尔比DIN:DRP
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值

□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氧·沉积物间隙水溶解氧 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氧·淡水溶解氧DO
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



mg/L


每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氧 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组Do原文百分比含义未核明，仅原单位旁列，不能解释为氧饱和度或mg/L。


溶解氧 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


溶解氧 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氧
各阶段环境指标分布



原文未注明（仅 ZYW-058 内比较）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。


溶解氧·溶解氧饱和度（已核明）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数

平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

pH

各阶段环境指标分布


○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值

可计算
来源数 平均值 中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

pH 各阶段环境指标分布




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

pH

各阶段环境指标分布

- 来源汇总值（已有均值）
- 来源汇总值（原始样品）
- ▬ 主要分布区间（中间50%）
- ◆ 平均值
- | 中位值

可计算来源数	平均值	中位值
--------	-----	-----



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

pH • pH (total标度, 25°C)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



无量纲 (total标度, 25°C)

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

pH • pH（标度未报告）
各阶段环境指标分布

○

来源汇总值（已有均值）

▬

主要分布区间（中间50%）

|

中位值

□

来源汇总值（原始样品）

◆

平均值

可计算来源数

平均值

中位值



pH（标度未报告，独立变量）

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。
本组原单位未核明，仅按当前原文口径列示，不能与其他单位组换算合并。

光照 / PAR
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

光周期
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值

暴发前	暂无本阶段数据	0	—	—
暴发期	暂无本阶段数据	0	—	—
衰退及结束后	暂无本阶段数据	0	—	—
无可用野外数值				

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

风速 · 10 m高度风速
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

风速·现场风速（高度未注明）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


CO₂分压·海表pCO₂ (浮标实测)

各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硅酸盐 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硅酸盐·硅酸盐 SiO₂ (原表质量口径)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硅酸盐·硅酸盐硅SiO3-Si
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值


□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算
来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


尿素氮 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氨基酸 · DFAAs
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解氨基酸 · THAA
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值

□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解有机碳 DOC 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

■ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算来源数


平均值

中位值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解有机碳 DOC 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解有机碳 DOC 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

化学需氧量 COD

各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值


□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总磷 TP
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值 可计算来源数 平均值 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总磷 TP • 总磷PT (mg/L原表口径)
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值 (已有均值)

□ 来源汇总值 (原始样品)

▬ 主要分布区间 (中间50%)

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



mg/L

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

颗粒磷 PP
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

▬ 主要分布区间（中间50%）

| 中位值


□ 来源汇总值（原始样品）

◆ 平均值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

透明度 • Secchi透明度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

透明度 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数


平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


溶解无机碳 DIC • 低潮浅洼溶解无机碳DIC
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

溶解无机碳 DIC 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总碱度 TAlk • 总碱度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。


总碱度 TAlk
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

颗粒有机碳 POC 各阶段环境指标分布




每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

颗粒有机碳 POC 各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氨 NH₃（原文口径）· 氨（NH₃，原文）
各阶段环境指标分布



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

叶绿素 a
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

硝酸盐与亚硝酸盐合计 NO_x • 硝酸盐加亚硝酸盐NO₃+NO₂
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值


中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氨氮（形态未说明）· 氨氮Ammonia-N（未区分NH3/NH4）
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值） 主要分布区间（中间50%） | 中位值 可计算来源数 平均值 中位值
□ 来源汇总值（原始样品） ◆ 平均值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

悬浮物 SS 各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



mg/L

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

生化需氧量 BOD
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总氮 TN
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



mg N/L

每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

水体光消光系数
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

水深·淡水水深
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

电导率·淡水电导率
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

总铁·淡水总铁
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）

◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

NaCl浓度 · 淡水NaCl浓度
各阶段环境指标分布

○

来源汇总值（已有均值）

▬

主要分布区间（中间50%）

|

中位值

□

来源汇总值（原始样品）


◆

平均值

可计算来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。

氯离子浓度 · 淡水氯离子浓度
各阶段环境指标分布

○ 来源汇总值（已有均值）

□ 来源汇总值（原始样品）

▬ 主要分布区间（中间50%）


◆ 平均值

| 中位值

可计算
来源数

平均值

中位值



每个点表示一个数据来源汇总后的数值；各来源先汇总，再等权计算平均值与中位值。
至少4个来源时显示主要分布区间（中间50%）及汇总值最低—最高线；少于4个仅显示已有点和中心值。
原文范围及±项不作为新增样本。三阶段共用数轴，具体汇总方法和来源记录见Excel“计算明细”。
来源按文献区分，不等于独立暴发事件；各阶段可来自不同事件，结果仅描述已收录资料。